

Medicijnen bij ontstoken ogen

fluormetholon



UW MEDICIJN IN HET KORT:

- ☐ Dit medicijn wordt gebruikt bij ontstoken ogen.
- ☐ Vermindert klachten zoals jeuk, roodheid en zwelling.
- ☐ Bij het druppelen kunnen uw ogen branderig of geïrriteerd aanvoelen. Dit verdwijnt snel. Als u hier veel last van heeft, neem dan contact op met uw dokter.



WERKING

Wat merkt u van ontstoken ogen?

Bij een oogontsteking kunnen verschillende delen van het oog klachten geven zoals roodheid, zwelling, pijn, jeuk en wazig zien.

Hoe helpt dit medicijn?

Fluormetholon zorgt ervoor dat de ontstekingsverschijnselen minder worden en de klachten afnemen.



GEBRUIK

Hoe lang moet u dit medicijn gebruiken?

De tijd dat u dit medicijn moet gebruiken hangt af van de klachten die u heeft. Het kan enkele dagen tot twee weken gebruikt worden. Soms ook langer. Uw dokter zal u vertellen hoe lang u dit medicijn moet gebruiken.

Wanneer merkt u dat dit medicijn helpt?

Na een aantal dagen moet u verbetering merken. Merkt u na een paar dagen geen verbetering of worden de klachten erger? Stop dan met het medicijn en neem contact op met uw dokter.

Hoe gebruikt u dit medicijn?

Als u lenzen draagt, doe deze dan uit. Zo lang u last heeft van uw oogontsteking kunt u beter geen lenzen dragen. Lees ook de bijsluiter voor meer informatie of vraag uw apotheker of dokter om advies over het gebruik van uw lenzen.

Druppel de oogdruppel in het oog volgens de instructie. Schud de flacon voor het gebruik. Hoe vaak u de druppels moet gebruiken staat op het etiket. Verdeel het gebruik goed over de dag als u de druppels meerdere keren per dag moet gebruiken.

Medicijn vergeten?

Druppel alsnog zo snel mogelijk, behalve als het alweer bijna tijd is voor de volgende dosis. Sla dan de vergeten dosis over en ga verder volgens uw normale schema. Het heeft geen zin een dubbele hoeveelheid te druppelen.

Hoe moet u dit medicijn bewaren?

Bewaar de oogdruppels bij kamertemperatuur. Als ze geopend zijn, zijn ze nog een maand houdbaar. U kunt

de datum van openen op de verpakking schrijven.



BIJWERKINGEN

Wat kunt u nog meer voelen als u dit medicijn gebruikt (bijwerkingen)?

De meeste medicijnen kunnen onbedoelde klachten geven. We noemen dit bijwerkingen. Deze oogdruppels kunnen irritatie geven bij het druppelen. Dit verdwijnt vaak snel weer. Als u hier veel last van heeft, neem dan contact op met uw dokter.

Ook komt het voor dat de oogboldruk hoger wordt. Als u dit medicijn langer dan twee weken moet gebruiken, zal de oogarts dit controleren.

Lees voor meer informatie ook de bijsluiter.